


Handschuhdesinfektion in 3 der 5 WHO-Momente bei einem Patienten

Versorgungsengpässen sowie generell zur Erhöhung der Händehygiene-Compliance empfehlen Experten die Hand-

schuhdesinfektion in folgenden 3 WHO-Momenten am gleichen Patienten:



-
- 2 Vor aseptischen Tätigkeiten
 - 3 Nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material
 - 5 Nach Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 / 34323 Malsfeld / Germany

T +49 5664 9496-0 / F +49 5664 8444

info@schumacher-online.com

www.schumacher-online.com

Quellen:

1. Kampf G et al. COVID-19-associated shortage of alcohol-based hand rubs, face masks and medical gloves - proposal for a risk-adapted approach to ensure patient and healthcare worker safety. Preprint 20. April 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.25649.12647.
2. Kampf G et al. Desinfektion behandschuhter Hände. Krankenhaushygiene 2018; 13: 27–40.
3. World Health Organization (WHO). My 5 Moments for Hand Hygiene. <https://www.who.int/gpsc/5may/background/5moments/en/>. Letzter Zugriff am 16.04.2020.




Dr. Schumacher

Handschuhdesinfektion in allen 5 WHO-Momenten bei einem Patienten

Bestehen Engpässe bei Einmalhandschuhen, kann abhängig von der Versorgungssituation und der Risikoabwägung

die Handschuhdesinfektion in allen 5 WHO-Momenten am gleichen Patienten sinnvoll sein:



- 1 Vor Patientenkontakt
- 2 Vor aseptischen Tätigkeiten
- 3 Nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material
- 4 Nach Patientenkontakt
- 5 Nach Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 / 34323 Malsfeld / Germany

T +49 5664 9496-0 / F +49 5664 8444

info@schumacher-online.com

www.schumacher-online.com

Quellen:

1. Kampf G et al. COVID-19-associated shortage of alcohol-based hand rubs, face masks and medical gloves - proposal for a risk-adapted approach to ensure patient and healthcare worker safety. Preprint 20. April 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.25649.12647.
2. World Health Organization (WHO). My 5 Moments for Hand Hygiene. <https://www.who.int/gpsc/5may/background/5moments/en/>. Letzter Zugriff am 16.04.2020.




Dr. Schumacher

Handschuhdesinfektion in allen 5 WHO-Momenten bei allen Patienten einer Kohorte (COVID-19-Isolierzimmer)

Bestehen weiterhin Engpässe bei Einmalhandschuhen, kann abhängig von der Versorgungssituation und der Risikoabwägung

die Handschuhdesinfektion in allen 5 Momenten bei allen Patienten einer Kohorte (COVID-19-Isolierzimmer) sinnvoll sein:



- 1 Vor Patientenkontakt
- 2 Vor aseptischen Tätigkeiten
- 3 Nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material
- 4 Nach Patientenkontakt
- 5 Nach Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 / 34323 Malsfeld / Germany

T +49 5664 9496-0 / F +49 5664 8444

info@schumacher-online.com

www.schumacher-online.com

Quellen:

1. Kampf G et al. COVID-19-associated shortage of alcohol-based hand rubs, face masks and medical gloves - proposal for a risk-adapted approach to ensure patient and healthcare worker safety. Preprint 20. April 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.25649.12647.
2. World Health Organization (WHO). My 5 Moments for Hand Hygiene. <https://www.who.int/gpsc/5may/background/5moments/en/>. Letzter Zugriff am 16.04.2020.



Dr. Schumacher